

**PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA DE SALTA Y JUJUY - ACTUALIZADO AL 12/2015**



CONTROL	INFORMACION DEL PRINCIPIO ACTIVO					PERIODO DE APLICACIÓN				OBSERVACIONES
	INGREDIENTE ACTIVO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS APROXIMADA	ACCION	FORMA DE APLICACIÓN	HASTA 30 DIAS	HASTA 60 DIAS	HASTA INICIO DE COSECHA	DURANTE LA COSECHA	
<b>ENFERMEDADES</b>	<b>INSECTICIDAS / ACARICIDAS</b>					<b>PERIODO DE APLICACIÓN</b>				
<b>MINADOR DEL TALLO</b>	IMIDACLOPRID 70% CLASE II	CONFIDOR 70 WG - PUNTO 70 - OTROS	270 - 300 GR/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo.
	THIAMETOXAN 25% CLASE IV	ACTARA	600 - 800 GR/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	
<b>CORTADOR</b>	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT	50-75 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Drench	SI	SI	NO	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo.  Aplicación nocturna.
	LAMBDA CIALOTRINA 25% CLASE II	KARATE ZEON - OTROS	30 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	
	DELTAMETRINA 20% CLASE IV	DECIS FLOW	30 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	
	BACILLUS TURINGIENSIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
<b>TRIPS</b>	ABAMECTINA 1,8% CLASE II	FAST - OLIMPO - VERTIMEC - OTROS	100 CC/100 LTS	CONTACTO, INGESTION Y TRASLAMINAR	PULVERIZADO	SI	SI	SI	SI	Utilizar coadyuvantes y mojar bien la planta. Puede agregarse aceite para mejorar penetración del p.a.
<b>ACARO ERIOFIDO - ARAÑUELA</b>	ABAMECTINA 1,8% CLASE II	FAST - OLIMPO - VERTIMEC - OTROS	100 CC/100 LTS	CONTACTO, INGESTION Y TRASLAMINAR	PULVERIZADO	SI	SI	SI	SI	Utilizar coadyuvantes y mojar bien la planta. Puede agregarse aceite para mejorar penetración del p.a.
<b>PULGONES</b>	IMIDACLOPRID 70% CLASE II	CONFIDOR 70 WG - PUNTO 70 - OTROS	120 GR/HA	SISTEMICA	Pulverizac.	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	Utilizar coadyuvantes.
	BIFENTRIN 10% CLASE II	TALSTAR - OTROS	100 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	
<b>COGOLLERO</b>	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT	100 - 125 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	NO	NO	Utilizar coadyuvantes, mojar parte superior de planta - BACTHUR aplicar por la mañana temprano o la tarde noche.
	METOXIFENOCIDE 24% CLASE IV	INTREPID	200 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
	BACILLUS TURINGIENSIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
<b>MARANDOVA</b>	METOXIFENOCIDE 24% CLASE IV	INTREPID	200 CC/HA	CONTACTO E INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	Utilizar coadyuvantes, mojar parte superior de planta - BACTHUR aplicar por la mañana temprano o la tarde noche.
	BACILLUS TURINGIENSIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	INGESTION	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
<b>ENFERMEDADES</b>	<b>FUNGICIDAS</b>					<b>PERIODO DE APLICACIÓN</b>				
<b>RHIZOCTONIA</b>	AZOXISTROBINA 25% CLASE IV	AMISTAR - SOXIS - QUADRIS	800 - 1000 CC/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	NO	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo
<b>PHYTOPHTORA</b>	METALAXIL 35% CLASE II	TARPAN	1000 CC/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	NO	NO	
	PROPAMOCARB 62% + FLUOPICOLIDE 6% CLASE III	INFINITO	500 CC/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	NO	NO	
	FOSETIL ALUMINIO 80% CLASE IV	ALLIETE - OTROS	2 KG/HA	SISTEMICA	Drench	SI	SI	NO	NO	

**PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA DE SALTA Y JUJUY - ACTUALIZADO AL 12/2015**



CONTROL	INFORMACION DEL PRINCIPIO ACTIVO					PERIODO DE APLICACIÓN				OBSERVACIONES
	INGREDIENTE ACTIVO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS APROXIMADA	ACCION	FORMA DE APLICACIÓN	HASTA 30 DIAS	HASTA 60 DIAS	HASTA INICIO DE COSECHA	DURANTE LA COSECHA	
MALEZAS	HERBICIDAS					PERIODO DE APLICACIÓN				
VARIAS	METOLACLORO 96% CLASE III	BAGUAL - DUAL GOLD - OTROS	700 - 1000 CC/HA	SISTEMICA Y RESIDUAL	Pulverizac.	SI	SI	NO	NO	Aplicar antes de emergencia de malezas
	CLOMAZONE 36% CLASE IV	COMMAND	500 - 700 CC/HA	SISTEMICA Y RESIDUAL	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	
ACCION	DESBROTADORES					PERIODO DE APLICACIÓN				
CONTACTO	ALCOHOLES GRASOS CLASE IV	FAIR 85%	1 GAL/200 LT	CONTACTO		Iniciar Desflore/Desbrote con no mas del 50 % de botón Floral.				Aplicar antes de inicio de cosecha
	FLUMETRALIN 12,4% CLASE II	PRIME - BROTAL -DREXALIN - DE ORO	3 - 4 -LT/200 LT	SISTEMICA						
	BUTRALIN 36% CLASE II	TOBAGO	3 - 4 -LT/200 LT	SISTEMICA						
SISTEMICO	HIDRAZIDA MALEICA 36% CLASE IV	VENDAVAL - MH 36	CONSULTAR AL TECNICO			Luego del Desflore y con mucha humedad Ambiente.				La dosis es de acuerdo al potencial de producción de la planta

Nota: por plagas que no figuran en este listado, consultar al técnico.

CLASIFICACION SEGÚN LOS RIESGOS			OBSERVACIONES
CLASE I a	ROJO	MUY TOXICO	DRENCH= Aplicación de producto planta por planta.- PULVERIZACION= Aplicación de producto con mochila o equipo de barras y picos. 30 DIAS= Aplicar hasta 30 días despues del transplante. 60 DIAS= Aplicar hasta 60 días despues del transplante. INICIO DE COSECHA= Aplicar productos hasta el inicio de cosecha.
CLASE I b	ROJO	TOXICO	
CLASE II	AMARILLO	PELIGROSO	
CLASE III	AZUL	CUIDADO	
CLASE IV	VERDE	CUIDADO	

**SEÑOR PRODUCTOR:**

- > UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN CADA APLICACIÓN.-
- > LAS DOSIS RECOMENDADAS EN ESTA GUIA SON LAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE Y ORIENTATIVAS.-
- > LEA ATENTAMENTE LOS MARBETES DE CADA PRODUCTO, DOSIS, MOMENTO DE APLICACIÓN Y TOXICIDAD.-
- > CONSULTE A SU TECNICO, DADO QUE LAS DOSIS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL VIGOR DEL CULTIVO Y TIPO DE SUELO.-