

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA DE JUJUY Y SALTA



PLAGA	INSECTICIDAS / ACARICIDAS				PERIODO DE APLICACIÓN				OBSERVACIONES
	INGREDIENTE ACTIVO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS APROXIMADA	FORMA DE APLICACIÓN	HASTA 30 DIAS	HASTA 60 DIAS	HASTA INICIO DE COSECHA	DURANTE LA COSECHA	
MINADOR DEL TALLO	IMIDACLOPRID 70% CLASE II	CONFIDOR 70 WG - PUNTO 70 - OTROS	270 - 300 GR/HA	Drench	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo.
	THIAMETOXAN 25% CLASE IV	ACTARA	600 - 800 GR/HA	Drench	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	
CORTADOR	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT	50-75 CC/HA	Drench	SI	SI	NO	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo.
	LAMBDA CIALOTRINA 25% CLASE II	KARATE ZEON - OTROS	30 CC/HA	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	Aplicación nocturna.
	DELTAMETRINA 20% CLASE IV	DECIS FLOW	30 CC/HA	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	
	BACILLUS TURINGIENCIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
PULGONES	IMIDACLOPRID 70% CLASE II	CONFIDOR 70 WG - PUNTO 70 - OTROS	120 GR/HA	Pulverizac.	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	Utilizar coadyuvantes.
	BIFENTRIN 10% CLASE II	TALSTAR - OTROS	100 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	Suspender tratamiento 15 días antes de cosecha.	NO	
COGOLLERO	FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III	BELT	100 - 125 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	NO	NO	Utilizar coadyuvantes, mojar parte superior de planta - BACTHUR aplicar por la mañana temprano o la tarde noche.
	METOXIFENOCIDE 24% CLASE IV	INTREPID	200 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
	BACILLUS TURINGIENCIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
MARANDOVA	METOXIFENOCIDE 24% CLASE IV	INTREPID	200 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	Utilizar coadyuvantes, mojar parte superior de planta - BACTHUR aplicar por la mañana temprano o la tarde noche.
	BACILLUS TURINGIENCIS CLASE IV	BAC THUR	500 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	SI	SI	
ENFERMEDADES	FUNGICIDAS				PERIODO DE APLICACIÓN				
RHIZOCTONIA	AZOXISTROBINA 25% CLASE IV	AMISTAR - SOXIS - QUADRIS	800 - 1000 CC/HA	Drench	SI	SI	NO	NO	Volumen de 400 l/ha como mínimo
PHYTOPHTORA	METALAXIL 35% CLASE II	TARPAN	1000 CC/HA	Drench	SI	SI	NO	NO	
	PROPAMOCARB 62% + FLUOPICOLIDE 6% CLASE III	INFINITO	500 CC/HA	Drench	SI	SI	NO	NO	
	FOSETIL ALUMINIO 80% CLASE IV	ALLIETE - OTROS	2 KG/HA	Drench	SI	SI	NO	NO	

PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA DE JUJUY Y SALTA



PLAGA	INSECTICIDAS / ACARICIDAS				PERIODO DE APLICACIÓN				OBSERVACIONES
	INGREDIENTE ACTIVO	PRODUCTO COMERCIAL	DOSIS APROXIMADA	FORMA DE APLICACIÓN	HASTA 30 DIAS	HASTA 60 DIAS	HASTA INICIO DE COSECHA	DURANTE LA COSECHA	
MALEZAS	HERBICIDAS				PERIODO DE APLICACIÓN				
VARIAS	METOLACLORO 96% CLASE III	BAGUAL - DUAL GOLD - OTROS	700 - 1000 CC/HA	Pulverizac.	SI	SI	NO	NO	Aplicar antes de emergencia de malezas
	CLOMAZONE 36% CLASE IV	COMMAND	500 - 700 CC/HA	Pulverizac.	SI	NO	NO	NO	
ACCION	DESBROTADORES				PERIODO DE APLICACIÓN				
CONTACTO	ALCOHOLES GRASOS CLASE IV	FAIR 85%	1 GAL/200 LT		Iniciar Desflore/Desbrote con no mas del 50 % de botón Floral				Aplicar antes de inicio de cosecha
	FLUMETRALIN 12,4% CLASE II	PRIME - BROTAL - DREXALIN - DE ORO	3 - 4 -LT/200 LT						
	BUTRALIN 36% CLASE II	TOBAGO	3 - 4 -LT/200 LT						
SISTEMICO	HIDRAZIDA MALEICA 36% CLASE IV	VENDAVAL - MH 36	CONSULTAR AL TECNICO						La dosis es de acuerdo al potencial de producción de la planta

Nota: por plagas que no figuran en este listado, consultar al técnico.

CLASIFICACION SEGÚN LOS RIESGOS			OBSERVACIONES
CLASE I a	ROJO	MUY TOXICO	DRENCH= Aplicación de producto planta por planta.-
CLASE I b	ROJO	TOXICO	PULVERIZACION= Aplicación de producto con mochila o equipo de barras y picos.
CLASE II	AMARILLO	PELIGROSO	30 DIAS= Aplicar hasta 30 dias despues del transplante.
CLASE III	AZUL	CUIDADO	60 DIAS= Aplicar hasta 60 dias despues del transplante.
CLASE IV	VERDE	CUIDADO	INICIO DE COSECHA= Aplicar productos hasta el inicio de cosecha.

SEÑOR PRODUCTOR:

- > UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN CADA APLICACIÓN.-
- > LAS DOSIS RECOMENDADAS EN ESTA GUIA SON LAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE Y ORIENTATIVAS.-
- > LEA ATENTAMENTE LOS MARBETES DE CADA PRODUCTO, DOSIS, MOMENTO DE APLICACIÓN Y TOXICIDAD.-
- > CONSULTE A SU TECNICO, DADO QUE LAS DOSIS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL VIGOR DEL CULTIVO Y TIPO DE SUELO.-